

# Lösungen B ASS U

## Aufgabe 1

a)  $f(x) = -1(x + 2)^2 + 1$  e)

b)  $f(x) = -1(x^2 + 4x + 4) + 1$

$$f(x) = -x^2 - 4x - 4 + 1$$

$$f(x) = -x^2 - 4x - 3$$

c)  $f(x) = 0$

$$0 = -x^2 - 4x - 3$$

$$0 = x^2 + 4x + 3$$

$$x_{1/2} = -2 \pm \sqrt{4 - 3}$$


$$x_{1/2} = -2 \pm 1$$

$$x_1 = -2 + 1 = -1$$

$$x_2 = -2 - 1 = -3$$

$S_{x1}(-1|0) \quad S_{x2}(-3|0)$

d)  $S_y(0|-3)$



## Aufgabe 2

a) Scheitel und Punkte einzeichnen und die beiden Punkte spiegeln.


b) aus Scheitel und einem Punkt den Faktor a berechnen  
 $S(2|0)$  und  $P(1|1,5)$

$$1,5 = a(1 - 2)^2 + 0$$

$$1,5 = a(-1)^2$$

$$1,5 = a$$

$$f(x) = 1,5(x - 2)^2 + 0$$



## Aufgabe 3

a) n; gestreckt; 4 Einheiten nach rechts und 4 Einheiten nach oben verschoben

$$d = \frac{-b}{2a} = \frac{-32}{2 \cdot (-4)} = 4$$

$$f(4) = 4$$

b)  $f(x) = 0$

$$0 = -4x^2 + 32x - 60$$

$$0 = x^2 - 8x + 15$$

$$x_{1/2} = +4 \pm \sqrt{16 - 15}$$

$$x_{1/2} = +4 \pm 1$$

$$x_1 = +4 + 1 = 5$$

$$x_2 = 4 - 1 = 3$$

$S_{x1}(5|0) \quad S_{x2}(3|0)$

c)  $f(x) = g(x)$

$$-4x^2 + 32x - 60 = 16x - 44$$

$$-4x^2 + 16x - 16 = 0 \mid :(-4)$$

$$x^2 - 4x + 4 = 0$$

$$x_{1/2} = +2 \pm \sqrt{4-4}$$

$$x_{1/2} = 2$$

$$g(2) = 16 \cdot 2 - 44 = -12$$

$S_{1/2}(2|-12)$  (doppelter Schnittpunkt = Berührpunkt)

#### Aufgabe 4

a)  $f(x) = a(x - x_1)(x - x_2)$

$$f(x) = 0,25(x - 0)(x - 4)$$

$$f(x) = 0,25x^2 - x$$

b)  $f(x) = 0,25(x^2 - 4x)$

$$f(x) = 0,25(x^2 - 4x + 4) - 1$$

$$f(x) = 0,25(x - 2)^2 - 1$$

c)  $S(2|-1)$

#### Aufgabe 5

a)  $f(x) = g(x)$

$$\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + 3 = -4x - 3$$

$$\frac{1}{2}x^2 + 3,5x + 6 = 0 \mid :(0,5)$$

$$x^2 + 7x + 12 = 0$$

$$x_{1/2} = -3,5 \pm \sqrt{12,25 - 12}$$

$$x_1 = -3 \text{ und } x_2 = -4$$

$$g(-3) = 9 \quad S_1(-3|9)$$

$$g(-4) = 13 \quad S_2(-4|13)$$

b) Parabel

$$S_y(0|3)$$

$$f(x) = 0$$

$$0 = \frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x + 3 \mid :0,5$$

$$0 = x^2 - x + 6$$

$$x_{1/2} = 0,5 \pm \sqrt{0,25 - 6}$$

n.l.

Keine Nullstellen

Gerade

$$S_y(0|-3)$$

$$g(x) = 0$$

$$0 = -4x - 3 \mid +4x$$

$$4x = -3 \mid :4$$

$$x = -0,75$$

$$S_x(-0,75|0)$$

## Aufgabe 6

Parabel 1 (Aus Scheitel und Punkt kann man a ermitteln.)

$$f(x) = a(x - d)^2 + e$$

$$-5 = a(0 - 3)^2 + 4$$

$$-5 = 9a + 4 \mid -4$$

$$-9 = 9a \mid :9$$

$$-1 = a$$

$$f(x) = -(x^2 - 6x + 9) + 4$$

$$f(x) = -x^2 + 6x - 9 + 4$$

$$f(x) = -x^2 + 6x - 5$$

Gleiche Nullstellen =>  $f(x) = 0$  für die erste Parabel

$$0 = -x^2 + 6x - 5 \mid :(-1)$$

$$0 = x^2 - 6x + 5$$

$$x_{1/2} = 3 \pm \sqrt{9 - 5}$$

$$x_1 = 5 \text{ und } x_2 = 1 \Rightarrow S_{x1}(5|0) \text{ und } S_{x2}(1|0)$$

Parabel 2

$$f(x) = 0,5(x - 5)(x - 1)$$

$$f(x) = 0,5(x^2 - x - 5x + 5)$$

$$f(x) = 0,5x^2 - 3x + 2,5$$