

# Lösungen E 16

## 1. Aufgabe

$$f(x) = \frac{1}{8}x^3 - \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{4}x + 3$$

1.  $D = \mathbb{R}$     2.  $x \rightarrow -\infty; f(x) \rightarrow -\infty$   
 $x \rightarrow +\infty; f(x) \rightarrow +\infty$     3. KS    4.  $S_y(0|3)$



- |  |
|--|
| 1. Definitionsbereich<br>2. Verlauf der Funktion<br>3. Symmetrie<br>4. $S_x / S_y$<br>5. Zeichnung |
|--|

$$f(x) = 0$$


$$0 = \frac{1}{8}x^3 - \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{4}x + 3 \quad | \cdot \frac{1}{8}$$

$$0 = x^3 - 3x^2 - 10x + 24 \quad \text{Polynomdivision mit } x_1 = 2 \text{ führt zu}$$

$$0 = x^2 - x - 12 \quad \text{p-q-Formel ergibt } x_2 = 4 \text{ und } x_3 = -3$$

$$S_{x_1}(2|0) \quad S_{x_2}(4|0) \quad S_{x_3}(-3|0)$$

## 5. Zeichnung



b)

$$f(x) = \frac{1}{8}x^3 - \frac{3}{8}x^2 - \frac{5}{4}x + 3$$

$$f'(x) = \frac{3}{8}x^2 - \frac{3}{4}x - \frac{5}{4}$$

$$f''(x) = \frac{3}{4}x - \frac{3}{4}$$

$$f'''(x) = \frac{3}{4}$$

$$f^4(x) = 0$$

c)

$$f'(x) = m \text{ und } f'(x) = \frac{3}{8}x^2 - \frac{3}{4}x - \frac{5}{4}$$

mit  $x_1 = 4$  ergibt sich  $f'(4) = 1,75$  also  $m_1 = 1,75$

mit  $x_2 = -2$  ergibt sich  $f'(-2) = 1,75$  also  $m_2 = 1,75$

## 2. Aufgabe

a)  $f(x) = -\frac{1}{4}x^3 + 3x$

1.  $D = \mathbb{R}$     2.  $x \rightarrow -\infty; f(x) \rightarrow +\infty$   
 $x \rightarrow +\infty; f(x) \rightarrow -\infty$



3. PS    4.  $S_y(0|0)$

4.  $S_y(0|0) \quad f(x) = 0$

$$0 = -\frac{1}{4}x^3 + 3x \quad | : \left(-\frac{1}{4}\right)$$

$$0 = x^3 - 12x \quad \text{x ausklammern}$$

$$0 = x(x^2 - 12)$$


$$x_1 = 0 \quad \vee \quad x^2 - 12 = 0 \quad | +12$$

$$x^2 = 12 \quad | \sqrt{\quad}$$

$$x_2 = 3,5 \quad \vee \quad x_3 = -3,5$$

$$S_{x_1}(0|0) \quad S_{x_2}(3,5|0) \quad S_{x_3}(-3,5|0)$$

5. Zeichnung



b)  $f'(x) = m \quad f'(x) = -\frac{3}{4}x^2 + 3$  mit  $x_1 = -4$  ergibt sich  $f'(-4) = -9$  also  $m_1 = -9$

c)  $f'(x) = m \quad f'(x) = -\frac{3}{4}x^2 + 3$  mit  $x_2 = +1$  ergibt sich  $f'(1) = 2,25$  also  $m_2 = 2,25$

d)  $f'(x) = m \quad f'(x) = -\frac{3}{4}x^2 + 3$  mit  $m = -\frac{15}{4}$  ergibt sich

$$-\frac{15}{4} = -\frac{3}{4}x^2 + 3 \quad | -3$$

$$-\frac{27}{4} = -\frac{3}{4}x^2 \quad | : \left(-\frac{3}{4}\right)$$

Stellen = x-Werte

$$9 = x^2 \quad | \sqrt{\quad}$$

daraus ergibt sich  $x_1 = 3 \quad \vee \quad x_2 = -3$

e)  $f'(x) = m \quad f'(x) = -\frac{3}{4}x^2 + 3$  mit  $m = 3$  ergibt sich

$$3 = -\frac{3}{4}x^2 + 3 \quad | -3$$

$$0 = -\frac{3}{4}x^2 \quad | : \left(-\frac{3}{4}\right)$$

$$0 = x^2 \quad | \sqrt{\quad}$$

daraus ergibt sich  $x_{1/2} = 0$

f)  $t(x) = m \cdot x + b \quad \Rightarrow$  y-Wert zu  $x = 0$  in der Ausgangsfunktion berechnen

$f(0) = 0$  mit  $m = 3$  ergibt sich

$$0 = 3 \cdot 0 + b$$

$$b = 0$$

$$\Rightarrow t(x) = 3x$$

g) senkrecht = orthogonal  $\Rightarrow m_1 \cdot m_2 = -1$

$m_1 = 3 \Rightarrow m_2 = -\frac{1}{3}$  Da es um den Ursprung geht, bleibt  $b = 0$ .

$$n(x) = -\frac{1}{3}x \quad \text{Gleichung der Normalen}$$

h) Steigungswinkel werden mit  $\tan(\alpha) = m$  berechnet.

$$\alpha = -83,65^\circ \Rightarrow \tan(-83,65) = -9 \text{ also } m = -9$$

$$f'(x) = m \quad f'(x) = -\frac{3}{4}x^2 + 3 \text{ mit } m = -9 \text{ ergibt sich}$$

$$-9 = -\frac{3}{4}x^2 + 3 \quad | -3$$

$$-12 = -\frac{3}{4}x^2 \quad | : \left(-\frac{3}{4}\right)$$

$$16 = x^2 \quad | \sqrt{\quad} \quad \text{daraus ergibt sich } x_1 = 4 \quad \vee \quad x_2 = -4$$

### 3. Aufgabe

a)  $f'(x) = m \quad f'(x) = 2x^2 + 4x$  mit  $m = 6$  ergibt sich

$$6 = 2x^2 + 4x \quad | -6$$

$$0 = 2x^2 + 4x - 6 \quad | : (2)$$

$$0 = x^2 + 2x - 3 \quad \text{p-q}$$

$$x_{1/2} = -1 \pm \sqrt{1+3}$$

$$x_1 = 1 \quad \vee \quad x_2 = -3$$

$$x_1 = 1$$

$$x_2 = -3$$

$$f(1) = \frac{8}{3}$$

$$f(-3) = 0$$

$$t(x) = m \cdot x + b$$

$$t(x) = m \cdot x + b$$

$$\frac{8}{3} = 6 \cdot 1 + b$$

$$0 = 6 \cdot (-3) + b$$

$$b = -\frac{10}{3}$$

$$\Rightarrow t_1(x) = 6x - \frac{10}{3}$$

$$b = 18$$

$$\Rightarrow t_2(x) = 6x + 18$$

b)  $t_1(x) = f(x)$

$$6x - \frac{10}{3} = \frac{2}{3}x^3 + 2x^2 \quad | -6x + \frac{10}{3}$$

$$0 = \frac{2}{3}x^3 + 2x^2 - 6x + \frac{10}{3} \quad | : \frac{2}{3}$$

$$0 = x^3 + 3x^2 - 9x + 5$$

Polynomdivision mit  $x_1 = 1$  (von Tangente vorgegeben) ergibt

$$x^2 + 4x - 5 = 0$$

p-q-Formel liefert  $x_2 = 1 \quad \vee \quad x_3 = -5$

$x = 1$  ist eine doppelte Lösung und somit die Stelle, an der die Tangente anliegt. Da nach dem weiteren Schnittpunkt gefragt ist, muss man die einfache Lösung benutzen.

$$f(-5) = -33\frac{1}{3} \quad (\text{und zur Überprüfung } t(-5) = -33\frac{1}{3}) \quad \Rightarrow \quad S_3(-5 | -33,3)$$

$t_2(x) = f(x)$

$$6x + 18 = \frac{2}{3}x^3 + 2x^2 \quad | -6x - 18$$

$$0 = \frac{2}{3}x^3 + 2x^2 - 6x - 18 \quad | : \frac{2}{3}$$

$$0 = x^3 + 3x^2 - 9x - 27$$

Polynomdivision mit  $x_1 = -3$  (von Tangente vorgegeben) ergibt

$$x^2 - 9 = 0$$

mit Wurzel ziehen erhält man  $x_2 = 3 \quad \vee \quad x_3 = -3$

$x = -3$  ist eine doppelte Lösung, kommt also nicht in Frage; somit

$$f(3) = 36 \quad \Rightarrow \quad S_3(3 | 36) \quad \text{Die Überprüfung in } t(x) \text{ sollte selbstverständlich sein.}$$

#### 4. Aufgabe

a)  $f'(x) = x^3 - 2x$

$$f'(1) = -1$$

$$f(1) = -2$$

$$t(x) = m \cdot x + b$$

$$-2 = -1 \cdot 1 + b \Rightarrow t_1(x) = -x - 1$$

$$b = -1$$

$$f'(-1) = 1$$

$$f(-1) = -2$$

$$t(x) = m \cdot x + b$$

$$-2 = 1 \cdot (-1) + b \Rightarrow t_2(x) = x - 1$$

$$b = -1$$

b) Da beide Tangenten den gleichen y-Achsenabschnitt ( $S_y$ ) besitzen, schneiden sie sich dort.

$$S(0|-1)$$

c)  $t_1(x) = f(x)$

$$-x - 1 = 0,25x^4 - x^2 - 1,25 \quad | + x + 1$$

$$0 = 0,25x^4 + 0x^3 - x^2 + x - 0,25 \quad | : 0,25 \quad + 0x^3 \text{ einfügen wegen Polynomdivision}$$

$$0 = x^4 + 0x^3 - 4x^2 + 4x - 1$$

Es müssen zwei Polynomdivisionen erfolgen, um eine quadratische Gleichung zu erhalten.

Die Teiler sind  $x_1 = 1$  und  $x_2 = 1$ , da eine Tangente eine doppelte Lösung liefert.  $S_{1/2}(1|-2)$

Nach der ersten Polynomdivision erhält man:  $0 = x^3 + x^2 - 3x + 1$

Nach der zweiten Polynomdivision:  $0 = x^2 + 2x - 1$

Aus p-q ergibt sich:  $x_3 = 0,4$  und  $x_4 = -2,4$

$t_1(0,4) = -1,4$        $S_3(0,4|-1,4)$       Berechnet man die y-Werte in  $f(x)$ , ergeben sich kleine

$t_1(-2,4) = 1,4$        $S_4(-2,4|1,4)$       Abweichungen, da die x-Werte gerundet wurden.

Da die Funktion Achsensymmetrie aufweist, kann man die beiden Schnittpunkte einfach an der y-Achse spiegeln, indem man nur die Vorzeichen der x-Werte ändert. Für  $t_2(x)$  gilt also:

$S_3(-0,4|-1,4)$  und natürlich  $S_{1/2}(-1|-2)$

$S_4(+2,4|1,4)$

#### 5. Aufgabe

1. Möglichkeit

$t(x) = 4$  ist eine waagrechte Tangente,

also ist für jeden x-Wert der y-Wert 4.

Man erhält den vollständigen Punkt (2|4).

Durch Einsetzen in  $f(x)$  erhält man a.

$$f(x) = ax^3 + 3x$$

$$4 = a \cdot 2^3 + 3 \cdot 2$$

$$4 = 8a + 6$$

$$-2 = 8a$$

$$-0,25 = a$$

2. Möglichkeit

$t(x) = 4$  ist eine waagrechte Tangente,

also ist die Steigung  $m = 0$ .

Bildet man die erste Ableitung und setzt

x-Wert und Steigung ein, erhält man a.

$$f'(x) = 3ax^2 + 3$$

$$0 = 3a \cdot 2^2 + 3$$

$$0 = 12a + 3$$

$$-3 = 12a$$

$$-0,25 = a$$

Die Funktionsgleichung lautet in beiden Fällen:  $f(x) = -0,25x^3 + 3x$ .